


孕婦糖尿病飲食規則

Principles of Gestational Diabetic Diet

懷孕婦女在懷孕期間血糖升高稱之為孕期糖尿（GDM）。孕期糖尿通常在懷孕 24 至 28 週開始。雖然有些婦女在嬰兒出生後依然有糖尿病的問題，但大部分的婦女在孕期過後都會恢復正常的血糖。

若母親在懷孕期不好好地控制糖尿病，這不但會影響嬰兒日後的健康，而且在臨盤時可能發生併發症。所以，如果你被診斷出患有孕期糖尿，請參考以下的指引以幫助你控制你的血糖。


1. 每日包括六小餐（三餐加叁次小吃），最好每二至叁小時吃一餐。



2. 餐後步行可以幫助降低血糖。在未實行運動前，應請教醫生。
3. 多選用含高纖維質的食品，例如糙米、乾豆、全麥麵包、麥片、鮮果、蔬菜，但份量要適當。

4. 早餐份量要比較少，並且不要含大量淀粉質，因早上血糖較為偏高。避免早上喝果汁或吃水果，牛奶份量不要超過半杯（四安士）。
5. 避免吃加工食品如五穀片（Cereal）或即食麵。
6. 在食物及飲料中減少用糖（沙糖、黃糖、冰糖、片糖、蜜糖）。
7. 減少或避免吃含有糖份的食品、飲料和調味品，例如果醬、果汁、糖果、各類甜品、甜酸食品、汽水、煉奶、甜豆漿、燒烤醬、海鮮醬、甜麵醬、酸梅醬、蠔油、日本甜豉油。
8. 避免喝酒。
9. 減少喝含有咖啡碱的飲品，例如咖啡、茶。
10. 減少吃煎炸、煎炒或肥膩食物，肉類應切除脂肪和皮。
11. 可以用少量植物油煮食。烹飪方法多選用蒸、燉、灼、煲、炖、焗。

食物种类



淀粉质*

粥、粉、麵、饭、麵包、麦片、梳打饼乾、薯仔、蕃薯、芋头、粟米、乾豆（眉豆、黑豆、黄豆、绿豆等）



蛋白质

瘦肉 - 猪、牛、鸡、鸭、火鸡、乳鸽


海鲜 - 鱼、蟹、带子、蚬、蠔、鲍鱼、龙虾、虾。

豆腐、蛋、花生酱、芝士、果仁、种子可以代替肉类。



蔬菜

各种瓜菜



水果*

新鲜



牛奶*

脱脂 (Fat Free) 或低脂 (1% LowFat) 鲜奶及淡奶 (Evaporated Milk)

加钙纯豆浆

脂肪

各类植物油 (Vegetable Oil) 例如: 芥菜子油 (Canola Oil)、橄榄油 (Olive Oil)、粟米油 (Corn Oil)、黄豆油 (Soybean Oil)、人造牛油 (Margarine)、沙律酱。

* 这些食品含有碳水化合物, 若进食过量会增高血糖。