

高血壓


High Blood Pressure

1. 甚麼是血壓？

血壓是指每次心臟跳動時，血流對血管壁所產生的壓力。血壓會隨著一天當中不同的時間或您所做的不同活動而變化。

2. 血壓是如何測量的？

血壓是使用一種稱為“血壓計”(Sphygmomanometer)的儀器來測量的。最普遍使用的方法是用水銀柱血壓計。血壓的水平顯示在一根以毫米計算的水銀柱上，通常是以二個數字來表示，如 120/80 mmHg，其分別代表收縮壓（高壓）及舒張壓（低壓）。收縮壓是指當心臟收縮時血液所產生的壓力。而舒張壓則是指當心臟呈舒張狀態時血液回流的壓力。



3. 甚麼是高血壓？

連續三次測量血壓，假如收縮壓（高壓）及舒張壓（低壓）分別維持在 130/80 mmHg 或以上，則意味著您患有高血壓症了。正常血壓應在 120/80 mmHg 以下。

4. 高血壓的症狀

高血壓通常無任何症狀，故有人稱其為“無聲殺手”。因此測量血壓是十分重要的。

5. 引起高血壓的原因

高血壓患者中，有九成病因仍不得而知。此種高血壓稱為原發性高血壓。因患有腎上腺，心臟或腎功能疾病而引起的高血壓則被

稱為繼發性高血壓。此種高血壓會隨病症的康復而消失。

6. 甚麼人會得高血壓？

任何人都有可能患上高血壓。然而，以下幾種因素會增加患高血壓的可能性：

- 家族有高血壓病史
- 男性
- 年齡增長
- 服用避孕丸（女性）
- 壓力
- 高脂肪及高鈉質飲食
- 過量喝酒
- 吸煙
- 超重
- 缺乏運動

7. 高血壓對健康的影響

高血壓如得不到控制，會加重心臟負荷，損害血管，由此而增加罹患中風、腎衰竭、心功能不全、心臟病突發以及失明的危險性。

8. 高血壓的治療

- 戒煙
- 勿過量飲酒
- 保持均衡體重
- 定期運動
- 減低壓力
- 遵從低脂肪，低鈉質的食譜：
 - 減少吃鹹（含高鈉質）的食物和調味品如：火腿、臘腸、咸魚、醃肉、罐頭食品、速食麵、鹽、醬油、魚露、蠔油、味精、豆豉、豆板醬、辣椒醬、蝦醬和腐乳等。

- 盡量少吃含高脂肪和高膽固醇的食物如：肥肉、動物的皮、煎炸食品、內臟（肝、腦、腰）、蛋黃、魷魚、蝦、甜點及點心等。
 - 選用低鈉質調味品如：芹菜、辣椒、黑椒、青椒、蒜頭、薑、洋蔥、芫茜、咖哩粉、五香粉、花椒、八角、醋及檸檬汁等。
 - 多吃含高鉀的食物可幫助降血壓
注意：腎功能衰弱的病人在增加服食鉀之前，應諮詢您的醫生。
 - 含高鉀質食物如：香蕉、杏、香瓜、蜜瓜、西柚、橙、蕃茄、西蘭花、西洋菜、薯仔、甜蕃薯、菠菜及苦瓜。
 - 按時服用醫生處方的藥物。
9. 治療高血壓的藥物：
- 改變生活方式及飲食習慣後，仍未使血壓降至正常水平時，則需服藥。
醫生會開如下其中一種或幾種藥物來幫助您降低血壓。
- 利尿劑（去水丸）- 排除體內過多的水份及鈉質。
 - 放鬆心臟藥 - 緩舒心臟跳動。
 - 血管舒張劑。
 - 神經中樞作用藥 - 防止血管變窄。

一旦您服食藥物來控制高血壓，您應按照醫生的說明按時服用，藥物才能生效。即使您感覺很正常，也要繼續服藥。治療高血壓的藥物通常需要長期服食才能保持血壓穩定。如有感覺不適的副作用產生，應立刻通知醫生。切勿自己停藥，以致血壓失去控制。如您正服用利尿劑（去水丸）的話，請諮詢您的醫生是否需要補充鉀質。

10. 感覺良好時為何仍要服藥？

高血壓患者可能完全無不舒服的症狀。但若不加治療，可能會損壞身體功能。所以，即使您感覺舒適，也要遵醫生建議按時服藥。

11. 高血壓的預防

許多高血壓的治療方案也適用於高血壓病的預防。例如，減輕體重，運動和緩解壓力等。飲食中多攝取水果，蔬菜，及低脂奶類製品也對預防高血壓很有幫助。

高血壓雖不能根治，但可以被控制。請遵從醫生指示，定期測量血壓。

您也可以在藥房購買血壓計，在家裡自我測量血壓，並將血壓指數記錄下來。

Reference:

National Heart, Lung and Blood Institute
<https://www.nhlbi.nih.gov/>

BLOOD PRESSURE (BP) GUIDELINES

BLOOD PRESSURE	NORMAL BP	ELEVATED BP	STAGE1 HYPERTENSION	STAGE2 HYPERTENSION
Systolic (top no.)	below 120	120 – 129	130 – 139	140 or above
	AND	AND	OR	OR
Diastolic (bottom no.)	below 80	below 80	80 – 89	90 or above

血壓指標

血壓	正常血壓	血壓偏高	第一期高血壓	第二期高血壓
收縮壓 (高壓)	120 以下	120 – 139	130 – 139	140 或以上
	和	和	或	或
舒張壓 (低壓)	80 以下	80 以下	80 – 89	90 或以上

Source: American College of Cardiology /American Heart Association, 2017